

化学療法（CHOP療法）を受けられる（ ）さんへ

説明者氏名（ ）説明日（ / ）STA2400040、STA2400041
STA2400042、STA2400043

月日（日時）	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/ ~ /
経過（病日等）	入院	治療当日	治療後1日目	治療後2日目	治療後3日目	治療後4日目	治療後5日目	治療後6日目	治療後7日目	治療後8日目～治療後13日目
達成目標	◇有害事象について理解できる ◇治療について理解できる	◇副作用のコントロールができています							→	【退院基準】 ◇骨髄抑制が許容範囲内である ◇経口摂取ができる
治療・薬剤 （点滴・内服） 処置		10時にアロキシ+アロカリス（制吐剤）を投与します ドキシルピシンを5分間で投与します オンコビン5分間で投与します エンドキサンを2時間で投与します 15分間生食を投与し終了です								
内服		治療の当日～治療4日目までプレドニンを（ ）錠内服します								
検査	胸腹部レントゲン・採血・検尿の 検査があります									
活動・安静度	履物はスリッパではなく靴を使用しましょう。 ナースコール、ベッド柵を設置します。	点滴をしているので気を付けて動いてください。	治療により筋力・体力が低下してきます。転倒予防のためリハビリがはじまります。 吐き気・発熱等の症状がある場合、転倒のリスクが高くなるため気を付けて動いてください。							
食事	常食です(制限はありません) できるだけ水分摂取を心がけて下さい。 食事の内容を変更することもできます。その際は看護師へご相談ください。									
清潔	毎日シャワー浴または清拭を行い、下着は毎日交換してください。手洗いも忘れずに行いましょう。									
処置		血糖測定を朝・夕食前に1日2回行います								
患者様及び ご家族への 説明 生活指導 リハビリ 栄養指導 服薬指導	担当医より治療についての説明があります。 薬剤師より内服薬の説明があります。 看護師より治療のスケジュールについて 説明があります。	担当医が治療開始前に点滴ルートをとりにきます。 点滴を投与中は異常がないか看護師が確認します。	※点滴の刺入部位の赤み・痛み・腫れに気付いたらお知らせください。 ※以下のような症状がでたときはすぐにお知らせください。 (吐気、嘔吐、倦怠感、手足のしびれ、便秘) また、この他に気になる症状がありましたら、お知らせください。				看護師より退院後の生活や外来での治療についての説明があります。 薬剤師より退院処方説明があります。			

注1 病名等は、現時点で考えられるものであり、今後検査等を進めていくに従って変わることがあります。
注2 入院期間については現時点で予想される期間です。

久留米大学病院 血液腫瘍内科 東棟14階病棟
2023.7月改訂