

大量メントレキセート療法を受けられる()さんへ

説明日(/) 説明者氏名()

STA2400050-0 STA2400052-0
STA2400051-0 STA2400053-0

月日(日時)	/	/	/	/	/	/	/	/	/
経過(病日等)	入院	治療前日	治療当日	治療後1日目	治療後2日目	治療後3日目	治療後4日目	治療後5日目	治療後6日目(退院)
達成目標	◇有害事象について理解できる ◇治療について理解できる		◇副作用のコントロールができています					◇日常生活の注意点について理解できる	【退院基準】 ◇骨髓抑制が許容範囲内である ◇経口摂取ができる
注射		14時から点滴が始まります(24時間投与)  生食 7%メイロン KCL ダイアモックスを打ちます(利尿剤) 【18時】	9時30分からアロキシ(制吐剤)の点滴投与を始めます 10時にメントレキセート(抗がん剤)を約3時間で投与します 13時に生食を投与し終了です ダイアモックスを打ちます(利尿剤) 【6時・12時・18時】	 ダイアモックスを打ちます(利尿剤) 【6時・12時・18時】 ロイコボリンを投与します(解毒剤) 【10時・16時・22時】	ダイアモックスを打ちます(利尿剤) 【6時・12時・18時】 ロイコボリンを投与します(解毒剤) 【4時・10時・16時・22時】	ダイアモックスを打ちます(利尿剤) 【6時・12時・18時】 ロイコボリンを投与します(解毒剤) 【4時】	ダイアモックスを打ちます(利尿剤) 【6時・12時・18時】	ダイアモックスを打ちます(利尿剤) 【6時・12時】	14時で点滴終了となります
内服	メントレキセート注と相性の悪い薬剤は、治療中は中止します 中止になる薬剤がある場合は、説明します								
検査 処置	採血・レントゲンの検査があります 	★体重測定(朝・夕)を行います 治療前日朝の体重+1.5kgで利尿剤を打ちます ★16時より尿量測定を開始します 1200ml/8時間以下で利尿剤を打ちます		採血があります 	採血があります 			採血があります 	朝のみ体重測定を行います 8時で尿量測定終了です
栄養	常食(制限はありません)食事の内容を変更することもできます。その際は看護師へご相談ください。								
排泄	制限はありません ★尿量測定に使用する尿コップはトイレに設置しているゴミ箱へ捨ててください								
活動・安静度	制限はありません								
安全	ナースコール・ベットの柵を設置します								
清潔	毎日シャワー浴または清拭を行い、下着は毎日交換してください。 感染しやすいので、手洗い・うがい・歯磨きを心掛けましょう。1日がいはいは8回、歯磨きは5回を目標にしましょう。								
患者様及びご家族への説明 生活指導 リハビリ 栄養指導 服薬指導	担当医より入院時・治療についての説明があります 看護師より治療についてのオリエンテーションがあります 薬剤師より薬の説明があります 	※点滴の刺入部の赤み・痛み・腫れに気付いたらお知らせください。 ※以下のような症状がでたときはすぐお知らせください。 (口内炎・下痢・吐気・排尿痛・尿が出にくい・手足のむくみ・息苦しさ) また、この他にも気になる症状がありましたら、お知らせください。 						退院後の生活について説明を行います 薬剤師より退院処方についての説明があります 	

注1 病名等は、現時点で考えられるものであり、今後検査等を進めていくに従って変わることがあります。

注2 入院期間については現時点で予想される期間です。

久留米大学病院 血液腫瘍内科 東棟14階病棟
2023. 6月改訂