経皮的血管形成術(PTA)を受けられる(

)さんへ

		説明日(/) 説明者氏名()	STA2700010
月日(日時)			/
経過(病日等)	入院日/検査前	検査後	2日目
達成目標		◇創部に問題がない ◇疼痛のコントロールができている	・ (退院基準) ◇創部に問題がない
(点滴・内服)	シャントと反対側の腕に点滴の針を刺します 検査に行く前に安定剤を飲みます 検査着に着替えます 呼び出しがあり次第、車椅子で3階の血管造影室へ向かいます	車椅子で部屋に戻ります 点滴を外して、針を抜きます 傷口の痛みに対して痛み止めの薬を飲むことができます 傷口の痛みがある場合は看護師へ申し出てください 検査から2時間後に枕子をとります	•
検査	検査はありません		•
活動·安静度	点滴をつないだ後は転倒に注意してください 	治療2時間後まではベッド上安静です 安静解除後は検査前の安静度に戻ります	制限はありません
	安全のためにベッド柵を設置します ベッドにナースコールを付けます	安静解除後は転倒に注意しましょう	制限はありません
	治療が終わるまで食事は食べられません 水を飲むことができます	治療後すぐに食事ができます	制限はありません
清潔	制限はありません	ご希望に応じて身体を拭きます	制限はありません
排泄	制限はありません		•
患者様な で を は を り は 活 い 養 薬 服 手 リ 、 り り り り り り り り り り り り り り り り り り	看護師から入院案内・治療の流れについて説明します 持参薬について薬剤師が説明を行います	治療後不明な点があればお尋ねください	先生の許可があれば退院となります 退院前に薬剤師から退院後の薬について説明を行います 退院後のシャントの管理について看護師から説明を行います ①シャントの腕で血圧測定や採血は実施しないでください ②シャントの音と拍動(スリル)を毎日確認してください 久留米大学病院 腎臓内科 東棟9階病棟

注1 病名等は、現時点で考えられるものであり、今後検査等を進めていくに従って変わることがあります。