




サ ラ サ ラ 薬 中 止 忘 れ て オ ペ 延 期

解説：血液サラサラのお薬（抗血栓薬）を入院前に中止していなかったこと入院後に気付いて、手術延期になることがあります。様々なケースがありますが、もし中止するのを忘れていたら、すぐにお伝えください。

手 術 前 止 め ん と い か ん サ ラ サ ラ 薬

手術の前は
一旦
中止してネ



解説：手術前にいったん中止しないといけない薬があります。特に血液サラサラのお薬（抗血栓薬）は1週間以上中止が必要なものもありますので、ご注意ください

手術と血液サラサラの薬

中止期間が長い血液サラサラの薬の例

(一部抜粋)

薬品名(成分名)	日数
アスピリン	7日
バイアスピリン(アスピリン)	
バファリン配合錠A (アスピリン・ダイアルミネート)	
キャブピリン配合錠(アスピリン含有)	
ロトリガ粒状カプセル (オメガ-3脂肪酸EPL)	
エパデール(イサノ酸EPL)	14日以上
エフィエント(プラスゲルル塩酸塩)	
クロピドグレル	10~14日
コンブラピン (アスピリン・クロピドグレル)	
チクロピジン	
ブリリント(チカゲレル)	5日
ワーファリン(ワルファリン)	3~5日

飲 ん で い る サ ラ サ ラ 薬 は 伝 え て ね

ああ、
血液サラサラ
のお薬
飲んでますよ



解説：血液サラサラの薬（抗血栓薬）は入院前から中止が必要で、中には2週間以上前から中止するものもあります。医師も確認はしますが、患者さん御自身またはご家族からも服用中であることをお伝えください。