

臨床検査項目基準値一覧(ダイジェスト版)

久留米大学病院 臨床検査部 2014.10.01 改訂

* 変更項目 F-XⅢ抗原

| 項目CD | 材料名 | 項目名 | 性差 | 基準値下限 | 基準値上限 | 単位名 |
|-------|-----|-----------|----|-------|-------|----------------------|
| 30100 | 全血 | 血液細胞数 | | | | |
| 30101 | 全血 | 赤血球数 | 男 | 430 | 570 | ×10 ⁴ /μL |
| 30101 | 全血 | 赤血球数 | 女 | 380 | 500 | ×10 ⁴ /μL |
| 30102 | 全血 | 血色素濃度 | 男 | 14.0 | 18.0 | g/dL |
| 30102 | 全血 | 血色素濃度 | 女 | 11.0 | 15.0 | g/dL |
| 30103 | 全血 | HCT | 男 | 40.0 | 52.0 | % |
| 30103 | 全血 | HCT | 女 | 34.0 | 45.0 | % |
| 30104 | 全血 | MCV | | 80 | 100 | fL |
| 30105 | 全血 | MCH | | 27.0 | 34.0 | pg |
| 30106 | 全血 | MCHC | | 31.0 | 36.0 | % |
| 30109 | 全血 | 白血球数 | | 40 | 90 | ×10 ² /μL |
| 30110 | 全血 | 血小板数 | | 13.0 | 36.0 | ×10 ⁴ /μL |
| 31000 | 全血 | 血液像 | | | | |
| 31001 | 全血 | 芽球 | | 0.0 | | % |
| 31002 | 全血 | 前骨髄球 | | 0.0 | | % |
| 31003 | 全血 | 骨髄球 | | 0.0 | | % |
| 31004 | 全血 | 後骨髄球 | | 0.0 | | % |
| 31005 | 全血 | 桿状核球 | | 4.0 | 14.0 | % |
| 31006 | 全血 | 分葉核球 | | 43.0 | 59.0 | % |
| 31007 | 全血 | 好中球% | | 40.0 | 70.0 | % |
| 31008 | 全血 | 好酸球% | | 2.0 | 4.0 | % |
| 31009 | 全血 | 好塩基球% | | 0.0 | 1.0 | % |
| 31010 | 全血 | リンパ球% | | 30.0 | 43.0 | % |
| 31011 | 全血 | 単球% | | 3.0 | 6.0 | % |
| 32001 | 全血 | RET‰ | | 5.0 | 25.0 | ‰ |
| 32002 | 全血 | RET# | | 0.8 | 12.0 | ×10 ⁴ /μL |
| 40202 | 血漿 | HPT-% | | 70 | 130 | % |
| 40302 | 血漿 | PT-% | | 70 | 130 | % |
| 40303 | 血漿 | PT-比 | | | | |
| 40304 | 血漿 | PT-INR | | 0.87 | 1.25 | |
| 40600 | 血漿 | APTT | | 27.0 | 43.0 | sec |
| 40700 | 血漿 | フィブリノーゲン | | 200 | 400 | mg/dL |
| 40800 | 血漿 | F-XⅢ抗原 | | ≥70 | | % |
| 40900 | 血漿 | F-Ⅷ活性 | | 60 | 150 | % |
| 41000 | 血漿 | Dダイマー | | <1.0 | | μg/mL |
| 41500 | 血漿 | FDP | | <5.0 | | μg/mL |
| 41600 | 血漿 | SF | | <7.0 | | μg/mL |
| 41900 | 血漿 | クロスミシング試験 | | | | |
| 42100 | 血漿 | AT活性 | | 84 | 117 | % |
| 42200 | 血漿 | α2PI | | 90 | 127 | % |
| 42300 | 血漿 | PLG活性 | | 96 | 117 | % |
| 42400 | 血漿 | TAT | | <3.0 | | ng/mL |
| 42500 | 血漿 | PC活性 | | 70 | 130 | % |
| 50100 | 随時尿 | 尿定性 | | | | |
| 50101 | 随時尿 | 糖 | | (-) | | mg/dL |
| 50102 | 随時尿 | ビリルビン | | (-) | | |
| 50103 | 随時尿 | ケトン体 | | (-) | | |

| 項目CD | 材料名 | 項目名 | 性差 | 基準値下限 | 基準値上限 | 単位名 |
|--------|-----|----------|----|-------|-------|--------------|
| 50104 | 随時尿 | 比重 | | 1.006 | 1.030 | |
| 50105 | 随時尿 | 潜血 | | (-) | | |
| 50106 | 随時尿 | pH | | 4.6 | 8.0 | |
| 50107 | 随時尿 | 蛋白 | | (-) | | mg/dL |
| 50108 | 随時尿 | ウロビリノーゲン | | 0.1 | 1.0 | Ehrlich単位/dL |
| 50109 | 随時尿 | 亜硝酸塩 | | (-) | | |
| 50110 | 随時尿 | 白血球反応 | | (-) | | |
| 50111 | 随時尿 | 混濁 | | | | |
| 50112 | 随時尿 | 色 | | | | |
| 51100 | 随時尿 | 尿沈査 | | | | |
| 51101 | 随時尿 | 尿赤血球 | | | | /HPF |
| 51102 | 随時尿 | 尿白血球 | | | | /HPF |
| 51103 | 随時尿 | 硝子円柱 | | | | |
| 51104 | 随時尿 | 顆粒円柱 | | | | |
| 51105 | 随時尿 | 扁平上皮 | | | | /HPF |
| 51106 | 随時尿 | 移行上皮 | | | | /HPF |
| 51107 | 随時尿 | 細菌 | | | | |
| 101000 | 血清 | AST | | 13 | 33 | U/L |
| 103000 | 血清 | ALT | | 6 | 30 | U/L |
| 104000 | 血清 | LD | | 119 | 229 | U/L |
| 106000 | 血清 | ALP | | 115 | 359 | U/L |
| 108000 | 血清 | γ-GT | | 10 | 47 | U/L |
| 110100 | 血清 | CHE | | 214 | 466 | U/L |
| 112000 | 血清 | 総蛋白 | | 6.70 | 8.30 | g/dL |
| 113000 | 血清 | アルブミン | | 4.00 | 5.00 | g/dL |
| 125000 | 血清 | 総ビリルビン | | 0.30 | 1.20 | mg/dL |
| 126000 | 血清 | 直ビリルビン | | ≤0.60 | | mg/dL |
| 131000 | 血清 | チモール | | 0.0 | 4.0 | クンケル単位 |
| 132000 | 血清 | クンケル | | 4.0 | 12.0 | クンケル単位 |
| 141000 | 血清 | 尿素窒素 | | 8.0 | 22.0 | mg/dL |
| 142000 | 血清 | クレアチニン | 男 | 0.60 | 1.10 | mg/dL |
| 142000 | 血清 | クレアチニン | 女 | 0.40 | 0.70 | mg/dL |
| 151200 | 血清 | 尿酸 | 男 | 3.60 | 7.00 | mg/dL |
| 151200 | 血清 | 尿酸 | 女 | 2.30 | 7.00 | mg/dL |
| 161000 | 血清 | Na | | 138 | 146 | mmol/L |
| 162000 | 血清 | K | | 3.6 | 4.9 | mmol/L |
| 163000 | 血清 | Cl | | 99 | 109 | mmol/L |
| 180000 | 血清 | CRP | | ≤0.20 | | mg/dL |
| 185001 | 全血 | 血沈30分 | | | | mm |
| 185002 | 全血 | 血沈60分 | 男 | 0.0 | 10.0 | mm |
| 185002 | 全血 | 血沈60分 | 女 | 0.0 | 15.0 | mm |
| 186001 | 血清 | グリコアルブミン | | 11.0 | 16.0 | % |
| 191200 | 血清 | カルシウム | | 8.70 | 10.30 | mg/dL |
| 192200 | 血清 | 無機リン | | 2.50 | 4.70 | mg/dL |
| 193200 | 血清 | マグネシウム | | 1.50 | 2.50 | mEq/L |
| 195300 | 血清 | UIBC | 男 | 180 | 274 | μg/dL |
| 195300 | 血清 | UIBC | 女 | 221 | 313 | μg/dL |
| 197000 | 血清 | フェリチン | 男 | 23.0 | 183.0 | ng/mL |
| 197000 | 血清 | フェリチン | 女 | 4.9 | 96.6 | ng/mL |
| 211300 | 血清 | アミラーゼ | | 42 | 132 | U/L |
| 212300 | 血清 | 膵アミラーゼ | | 16 | 67 | U/L |
| 213300 | 血清 | 唾液アミラーゼ | | 8 | 84 | U/L |
| 214200 | 血清 | リパーゼ | | ≤140 | | U/L |
| 215300 | 血清 | 総胆汁酸 | | ≤10.0 | | μmol/L |

| 項目CD | 材料名 | 項目名 | 性差 | 基準値下限 | 基準値上限 | 単位名 |
|--------|-----|------------|----|--------|-------|-------|
| 220000 | 血清 | 総コレステロール | | 128 | 219 | mg/dL |
| 221300 | 血清 | HDLコレステロール | | 40.0 | 96.0 | mg/dL |
| 222300 | 血清 | 中性脂肪 | | 30 | 149 | mg/dL |
| 223300 | 血清 | リン脂質 | | 160 | 250 | mg/dL |
| 224300 | 血清 | LDLコレステロール | | ≤139.0 | | mg/dL |
| 250200 | 血清 | CK | 男 | 62 | 287 | U/L |
| 250200 | 血清 | CK | 女 | 45 | 163 | U/L |
| 251200 | 血清 | CK-MB | | ≤12 | | U/L |
| 271000 | 血漿 | 血糖 | | 80 | 109 | mg/dL |
| 272000 | 全血 | グリコヘモグロビン | | | | |
| 272003 | 全血 | HbF | | | | % |
| 272004 | 全血 | HbA1c-NGSP | | 4.6 | 6.2 | % |
| 286100 | 血清 | IgA | | 103 | 409 | mg/dL |
| 286200 | 血清 | IgM | | 40 | 221 | mg/dL |
| 286300 | 血清 | IgG | | 918 | 1742 | mg/dL |
| 287000 | 血清 | IgE | | ≤250.0 | | IU/mL |
| 288100 | 血清 | C3 | | 72 | 144 | mg/dL |
| 288200 | 血清 | C4 | | 10 | 40 | mg/dL |
| 331400 | 随時尿 | 妊娠反応 | | (-) | | |