

50-90kg（1-2コース目）Epd 療法

◎化学療法のスケジュール

4週間（28日間）を1コースとして繰り返します。

（副作用の度合いにより、スケジュールの延期や治療内容に変更があります。）

薬剤名	手技	点滴時間	実施日			
			1日目	8日目	15日目	22日目
デキサメタゾン 6.6mg 生食 50mL	点滴	15分	○	○	○	○
クロルフェニラミン 5mg ファモチジン 20mg 生食 50mL <small>（同時に「カロナール400mg」内服）</small>	点滴	15分	○	○	○	○
生食 100mL	点滴	30分	○	○	○	○
エロツズマブ (10mg/kg) 蒸留水 100mL (0.4mL/kg) 生食 250mL	点滴	※下記の記載に従って投与	○	○	○	○
生食 50mL <small>（エロツズマブ投与終了後に投与開始）</small>	点滴	30分	○	○	○	○

★【Day1-21】ポマリドミドカプセル 4mg/Day（21日間内服7日間休薬）

★【Day1、8、15、22】レナデックス錠 28mg/Day（※75歳越えは8mg）エロツズマブ（エムプリシ
ティ®）投与3～24時間前に内服

※ エロツズマブ（エムプリシティ®）の投与速度設定

Day1 【1サイクル目】投与開始から30分毎に0.5→1.0→最大2.0mL/分

【2サイクル目】投与開始から5.0mL/分

Day8 【1サイクル目】[投与開始～30分：3.0mL/分] [30分以降：4.0mL/分（最大）]

【2サイクル目】投与開始から5.0mL/分

Day15 【1サイクル目】投与開始から5.0mL/分

【2サイクル目】投与開始から5.0mL/分

Day22 【1サイクル目】投与開始から5.0mL/分

【2サイクル目】投与開始から5.0mL/分

●エロツズマブ（エムプリシティ®）300mgバイアルは13mL、400mgバイアルは17mLの蒸留
水で溶解し（25mg/mL）必要量を採取する。

50-90kg（3コース目以降）Epd 療法

◎化学療法のスケジュール

4週間（28日間）を1コースとして繰り返します。

（副作用の度合いにより、スケジュールの延期や治療内容に変更があります。）

薬剤名	手技	点滴時間	実施日
			1日目
デキサメタゾン 6.6mg 生食 50mL	点滴	15分	○
クロルフェニラミン 5mg ファモチジン 20mg 生食 50mL (同時に「コロナール400mg」内服)	点滴	15分	○
生食 100mL	点滴	30分	○
エロツズマブ (20mg/kg) 蒸留水 100mL (0.8mL/kg) 生食 250mL	点滴	【3サイクル目】 投与開始～30分：3.0mL/分 30分以降4.0mL/分 【4サイクル目以降】 投与開始から5.0mL/分	○
生食 50mL (エロツズマブ投与終了後に投与開始)	点滴	30分	○

★【Day1-21】ポマリドミドカプセル 4mg/Day（21日間内服7日間休薬）

★【Day1】レナデックス錠 28mg/Day(※75歳越えは8mg)エロツズマブ（エムプリシティ®）投与3～24時間前に内服

★【Day8、15、22】レナデックス錠 40mg/Day(※75歳越えは20mg)

●エロツズマブ（エムプリシティ®）300mgバイアルは13mL、400mgバイアルは17mLの蒸留水で溶解し（25mg/mL）必要量を採取する。