

Bev+mFOLFOX6(脱感作)療法
(※オキサリプラチンアレルギー患者に対して使用)

◎化学療法のスケジュール

2週間(14日間)を1コースとして繰り返します。

(副作用の度合いにより、スケジュールの延期や治療内容に変更があります。)

薬剤名	手技	点滴時間	実施日
			1日目
ベバシズマブ (5mg/kg) 生食 100mL	点滴	初回90分 2回目60分 それ以降30分	○
パロノセトロン 0.75mg デキサメタゾン 6.6mg	点滴	15分	○
ファモチジン 20mg クロルフェニラミン 5mg ヒドロコルチゾン 200mg 生食 50mL	点滴	15分	○
レボホリナート (200mg/m ²) 5%ブドウ糖 250mL	点滴	120分	○
オキサリプラチン原液 0.25mL 5%ブドウ糖 (総量を250mLとする)	点滴	60分	○
オキサリプラチン原液 2.5mL 5%ブドウ糖 (総量を250mLとする)	点滴	60分	○
オキサリプラチン原液 25mL 5%ブドウ糖 (総量を250mLとする)	点滴	120分	○
オキサリプラチン (85mg/m ²) 5%ブドウ糖 250mL	点滴	400分	○
フルオロウラシル (400mg/m ²) 生食 50mL	点滴	15分	○
フルオロウラシル (2400mg/m ²) 生食 (総量を100mLとする)	46時間持続投与	46時間	○

オキサリプラチン原液から0.25mL、2.5mL、25mL抜き取り、それぞれ5%ブドウ糖へ混注。
 1000倍希釈→100倍希釈→10倍希釈と、徐々に濃度をあげて投与する。