

## ブレンツキシマブ ベドチン単独療法(85kg以下↓)

### ◎化学療法のスケジュール

3週間(21日間)を1コースとして繰り返します。

(副作用の度合いにより、スケジュールの延期や治療内容に変更があります。)

薬剤名	手技	点滴時間	実施日
			1日目
メチルプレドニゾン 125mg 生食 50mL	点滴	30分	○
※ブレンツキシマブ ベドチン (1.8mg/kg) 【最大投与量 180mg】 蒸留水 (0.36mL/kg) 生食 100ml	点滴	30分	○

### ※ ブレンツキシマブ ベドチン(アドセトリス<sup>®</sup>)

infusion reaction 予防として「カロナールとポララミン」で前処置を行う。

1バイアルを蒸留水10.5mLで溶解。濃度5mg/mLの溶解液になる。

最終濃度が0.4 ~ 1.2mg/mLとなるように日局生理食塩液又は5%ブドウ糖注射液で希釈する。

生食 50ml	点滴	10分	○
---------	----	-----	---

## ブレンツキシマブ ベドチン単独療法(85kg越え)

### ◎化学療法のスケジュール

3週間(21日間)を1コースとして繰り返します。

(副作用の度合いにより、スケジュールの延期や治療内容に変更があります。)

薬剤名	手技	点滴時間	実施日
			1日目
メチルプレドニゾン 125mg 生食 50mL	点滴	30分	○
※ブレンツキシマブ ベドチン (1.8mg/kg) 【最大投与量 180mg】 蒸留水 (0.36mL/kg) 生食 100ml	点滴	30分	○

### ※ ブレンツキシマブ ベドチン(アドセトリス®)

infusion reaction 予防として「カロナールとポララミン」で前処置を行う。

調製時1バイアルを蒸留水10.5mLで溶解し5mg/mLの溶解液にする。

最終濃度が0.4 ~ 1.2mg/mLとなるように日局生理食塩液又は5%ブドウ糖注射液で希釈する。

生食 50ml	点滴	10分	○
---------	----	-----	---