

G-CHOP 療法（1コース目）

◎化学療法のスケジュール

3週間（21日間）を1コースとして繰り返します。

（副作用の度合いにより、スケジュールの延期や治療内容に変更があります。）

薬剤名	手技	点滴時間	実施日	実施日	実施日
			1日目	8日目	15日目
※オビヌツズマブ （1000mg/body） 生食 （全量250mLとする）	点滴	（初回）30分毎に12.5→25→37.5→50→ 62.5→75→87.5→最大100mL/hrまで （前回G2以上のIFが発現しなかった場合） 2回目～：30分毎に25→50→75→最大100 mL/hr	○	○	○

※オビヌツズマブ（ガザイバ®）投与30分前にカロナール400mg、ポララミン2mgの内服を行う。
（IFで中断後の再開）半分の速度で再開。以後30分毎に12.5mL/hrずつ最大100mL/hrまで

生食 100ml	点滴	30分 （ガザイバ®投与後30分間は経過観察） （ガザイバ®投与終了後に投与開始）	—	○	○
生食 50mL	点滴	30分 （ガザイバ®投与後30分間は経過観察） （ガザイバ®投与終了後に投与開始）	○	—	—
パロノセトロン 0.75mg	点滴	15分	○	—	—
ドキシソルピシン （50mg/m ² ） 5%ブドウ糖 50mL	点滴	10分（全開）	○	—	—
ピンクリスチン （1.4mg/m ² ） [最大投与量2mg] 生食 50mL	点滴	10分（全開）	○	—	—
エンドキサン （750mg/m ² ） 生食 500mL	点滴	120分	○	—	—
生食 50mL	点滴	15分	○	—	—

薬剤名	手技		用法・用量
プレドニン60mg/m ² 1日1回 [max100mg]	内服	朝食後	day1～5

G-CHOP 療法（2-6コース目）

◎化学療法のスケジュール

3週間(21日間)を1コースとして繰り返します。

(副作用の度合いにより、スケジュールの延期や治療内容に変更があります。)

薬剤名	手技	点滴時間	実施日
			1日目
※オビヌツズマブ (1000mg/body) 生食 (全量250mLとする)	点滴	(前回G2以上のIFが発現しなかった場合) 2回目～:30分毎に25→50→75→最大100 mL/hr	○

※オビヌツズマブ(ガザイバ[®])投与30分前にカロナール400mg、ポララミン2mgの内服を行う。
(IFで中断後の再開)半分の速度で再開。以後30分毎に12.5mL/hrずつ最大100mL/hrまで

生食 50mL	点滴	30分 (ガザイバ [®] 投与後30分間は経過観察) (ガザイバ [®] 投与終了後に投与開始)	○
パロノセトロン 0.75mg	点滴	15分	○
ドキシソルビシン (50mg/m ²) 5%ブドウ糖 50mL	点滴	10分(全開)	○
ピンクリスチン (1.4mg/m ²) [最大投与量2mg] 生食 50mL	点滴	10分(全開)	○
エンドキサン (750mg/m ²) 生食 500mL	点滴	120分	○
生食 50mL	点滴	15分	○

薬剤名	手技		用法・用量
プレドニン60mg/m ² 1日1回 [max100mg]	内服	朝食後	day1～5

G-CHOP 療法（7-8コース目）

◎化学療法のスケジュール

3週間(21日間)を1コースとして繰り返します。

(副作用の度合いにより、スケジュールの延期や治療内容に変更があります。)

薬剤名	手技	点滴時間	実施日
			1日目
※オビヌツズマブ (1000mg/body) 生食 (全量250mLとする)	点滴	(前回G2以上のIFが発現しなかった場合) 2回目～:30分毎に25→50→75→最大100 mL/hr	○

※オビヌツズマブ(ガザイバ®) 投与30分前にカロナール400mg、ポラミン2mgの内服を行う。
 (IFで中断後の再開) 半分の速度で再開。以後30分毎に12.5mL/hrずつ最大100mL/hrまで

生食 100mL	点滴	30分 (ガザイバ®投与後30分間は経過観察) (ガザイバ®投与終了後に投与開始)	○
----------	----	--	---