

NewFP療法(外来)

◎化学療法のスケジュール

14日間を1コースとして繰り返します。

(副作用の度合いにより、スケジュールの延期や治療内容に変更があります。)

薬剤名	手技	点滴時間	実施日
			1日目
シスプラチン[動注用] 50mg/body	動注	20分	○
フルオロウラシル 250mg/body	動注	ワンショット	○
フルオロウラシル 500mg/body ヘパリンNa 1000単位 生食 9mL	動注	120分	○
ソルアセトD 500mL	点滴	180分	○

※シスプラチン(アイエーコール®)

アイエーコール50mg/Vにイオパミドール5.5mLを加え十分に懸濁し、10~50mg分取する。
リピオドール(5~10cc)を吸引・分取し、シリンジ内で十分混和する。

NewFP療法(入院)

◎化学療法のスケジュール

21日間を1コースとして繰り返します。

(副作用の度合いにより、スケジュールの延期や治療内容に変更があります。)

薬剤名	手技	点滴時間	実施日			休薬	実施日			休薬
			0日目	1日目	2日目	3-6日目	7日目	8日目	9日目	10-21日目
生食 500mL (前日の21時より開始)	点滴	12時間30分	○	—	—		○	—	—	
シスプラチン[動注用] 50mg/body	動注	20分	—	○	—		—	○	—	
フルオロウラシル 250mg/body	動注	ワンショット	—	○	—		—	○	—	
フルオロウラシル 1250mg/body ヘパリンNa5000単位 生食15mL	動注	5日間 持続投与	—	○	—		—	○	—	
ソルアセトF 500mL 硫酸Mg補正液20mL	点滴	150分	—	○	—		—	○	—	
ソルデム3A 500mL	点滴	150分	—	○	—		—	○	—	
ソルアセトF 500mL	点滴	150分	—	○	○		—	○	○	
ソルデム3A 500mL	点滴	150分	—	○	—		—	○	—	

※シスプラチン(アイエーコール®)

アイエーコール50mg/Vにイオパミドール5.5mLを加え十分に懸濁し、10~50mg分取する。
リピオドール(5~10cc)を吸引・分取し、シリンジ内で十分混和する。