

Pertu+HER+Cap療法(初回)

◎化学療法のスケジュール

3週間(21日間)を1コースとして繰り返します。

(副作用の度合いにより、スケジュールの延期や治療内容に変更があります。)

薬剤名	手技	点滴時間	実施日
			1日目
生食 50mL	点滴	15分	○
ペルツズマブ (840mg/body) 生食 250mL	点滴	60分	○
生食 250mL	点滴	60分	○
トラスツズマブ (8mg/kg) 生食 250mL	点滴	90分	○
生食 50mL	点滴	15分	○

- 手術不能又は再発乳癌にはA法又はB法を使用する。

A法 1日2回21日間経口投与し、その後7日間休薬する。これを1コースとして繰り返す。

体表面積	1回用量
1.31m ² 未満	900mg
1.31m ² 以上1.64m ² 未満	1200mg
1.64m ² 以上	1500mg

B法 1日2回14日間経口投与し、その後7日間休薬する。これを1コースとして繰り返す。

体表面積	1回用量
1.33m ² 未満	1500mg
1.33m ² 以上1.57m ² 未満	1800mg
1.57m ² 以上1.81m ² 未満	2100mg
1.81m ² 以上	2400mg

Pertu+HER+Cap療法 (2回目以降)

◎化学療法のスケジュール

3週間(21日間)を1コースとして繰り返します。

(副作用の度合いにより、スケジュールの延期や治療内容に変更があります。)

薬剤名	手技	点滴時間	実施日
			1日目
生食 50mL	点滴	15分	○
ペルツズマブ (420mg/body) 生食 250mL	点滴	30分	○
生食 100mL	点滴	30分	○
トラスツズマブ (6mg/kg) 生食 250mL	点滴	60分 忍容性良好であれば30 分で投与可	○
生食 50mL	点滴	15分	○

- 手術不能又は再発乳癌にはA法又はB法を使用する。

A法 1日2回21日間経口投与し、その後7日間休薬する。これを1コースとして繰り返す。

体表面積	1回用量
1.31㎡未満	900mg
1.31㎡以上1.64㎡未満	1200mg
1.64㎡以上	1500mg

B法 1日2回14日間経口投与し、その後7日間休薬する。これを1コースとして繰り返す。

体表面積	1回用量
1.33㎡未満	1500mg
1.33㎡以上1.57㎡未満	1800mg
1.57㎡以上1.81㎡未満	2100mg
1.81㎡以上	2400mg