

Pertu+HER+Erib (初回) 療法

◎化学療法のスケジュール

3週間(21日間)を1コースとして繰り返します。

(副作用の度合いにより、スケジュールの延期や治療内容に変更があります。)

薬剤名	手技	点滴時間	実施日	実施日
			1日目	8日目
デキサメタゾン 6.6mg 生食 50mL	点滴	15分	○	○
ペルツズマブ (840mg/body) 生食 250mL	点滴	60分	○	—
生食 250mL	点滴	60分	○	—
トラスツズマブ (8mg/kg) 生食 250mL	点滴	90分	○	—
エリブリン (1.4mg/m ²) 生食 50mL	点滴	5分	○	○
生食 50mL	点滴	15分	○	○

Pertu+HER+Erib療法（2回目以降）

◎化学療法のスケジュール

3週間(21日間)を1コースとして繰り返します。

(副作用の度合いにより、スケジュールの延期や治療内容に変更があります。)

薬剤名	手技	点滴時間	実施日	実施日
			1日目	8日目
デキサメタゾン 6.6mg 生食 50mL	点滴	15分	○	○
ペルツズマブ (420mg/body) 生食 250mL	点滴	30分	○	—
生食 100mL	点滴	30分	○	—
トラスツズマブ (6mg/kg) 生食 250mL	点滴	60分 忍容性良好であれば30分で 投与可	○	—
エリブリン (1.4mg/m ²) 生食 50mL	点滴	5分	○	○
生食 50mL	点滴	15分	○	○