

## リツキシマブ+ベンダムスチン 療法

### ◎化学療法のスケジュール

4週間(28日間)を1コースとして繰り返します。

(副作用の度合いにより、スケジュールの延期や治療内容に変更があります。)

薬剤名	手技	点滴時間	実施日	
			1日目	2日目
パロノセトロン 0.75mg	点滴	15分	○	—
生食 50mL	点滴	15分	—	○
※ベンダムスチン (90mg/m <sup>2</sup> ) 蒸留水 (36mL/m <sup>2</sup> ) 生食 500mL	点滴	90分	○	○

### ※ベンダムスチン(トレアキシン®)

100mg1バイアルを蒸留水40mLで溶解し(濃度2.5mg/mL)必要量を生食等で希釈する。

生食 50mL	点滴	全開	○	○
リツキシマブ 生食 500mL	点滴	初回:30分毎に50→100→150→ 200→250→300→350→400ml/hr 2回~:30分毎に100→200→300→ →400ml/hr (*投与速度に関しては、指示簿を参照)	○	—

### ○ リツキシマブの投与量(当院における投与量設定)

体表面積1.33m<sup>2</sup>以下は500mg

体表面積1.34~1.6m<sup>2</sup>は600mg

体表面積1.61~1.86m<sup>2</sup>は700mg

体表面積1.87m<sup>2</sup>以上は800mg

【\*リツキシマブの投与量に合わせて生食の量を調節する(10倍希釈)】

生食 50ml	点滴	15分	○	—
---------	----	-----	---	---