

R-CHOP 療法

◎化学療法のスケジュール

3週間(21日間)を1コースとして繰り返します。

(副作用の度合いにより、スケジュールの延期や治療内容に変更があります。)

薬剤名	手技	点滴時間	実施日
			1日目
リツキシマブ (375mg/m ²) 生食 500ml	点滴	初回: 30分毎に50→100→150→200 →250→300→350→400ml/hr 2回~: 30分毎に100→200→300→ →400ml/hr (*投与速度に関しては、指示簿を参照)	○

○ リツキシマブの投与量(当院における投与量設定)

体表面積1.33m²以下は500mg

体表面積1.34~1.6m²は600mg

体表面積1.61~1.86m²は700mg

体表面積1.87m²以上は800mg

【*リツキシマブの投与量に合わせて生食の量を調節する(10倍希釈)】

パロノセトロン 0.75mg	点滴	15分	○
ドキシソルビシン (50mg/m ²) 5%ブドウ糖 50ml	点滴	10分(全開)	○
ビンクリスチン (1.4mg/m ²) [最大投与量2mg] 生食 50ml	点滴	10分(全開)	○
エンドキサン (750mg/m ²) 生食 500ml	点滴	120分	○
生食 50ml	点滴	15分	○

薬剤名	手技		用法・用量
プレドニン60mg/m ² 1日1回 [max100mg]	内服	朝食後	day1~5