

R-GCD 療法

◎化学療法のスケジュール

3週間(21日間)を1コースとして繰り返します。

(副作用の度合いにより、スケジュールの延期や治療内容に変更があります。)

| 薬剤名 | 手技 | 点滴時間 | 実施日 | 実施日 |
|---------------------------|----|------|-----|-----|
| | | | 1日目 | 8日目 |
| デキサメタゾン 33.0mg 生食 50mL | 点滴 | 15分 | ○ | - |

※day2-4は内服(デカドロン40mg/日を忘れずに処方すること)

| | | | | |
|--|----|--|---|---|
| グラニセトロン 3mg | 点滴 | 15分 | ○ | ○ |
| ※ ゲムシタビン (1000mg/m ²) 生食 100ml | 点滴 | 30分 | ○ | ○ |
| 生食 50ml | 点滴 | 15分 | - | ○ |
| リツキシマブ (375mg/m ²) 生食 500ml | 点滴 | 初回: 30分毎に50→100→150→200 →250→300→350→400ml/hr 2回~: 30分毎に100→200→300→ →400ml/hr (*投与速度に関しては、指示簿を参照) | - | ○ |

○ リツキシマブの投与量(当院における投与量設定)

体表面積1.33m²以下は500mg

体表面積1.34~1.6m²は600mg

体表面積1.61~1.86m²は700mg

体表面積1.87m²以上は800mg

【*リツキシマブの投与量に合わせて生食の量を調節する(10倍希釈)】

| | | | | |
|-----------------------------------|----|-----|---|---|
| カルボプラチン (AUC5) 5%ブドウ糖 250ml | 点滴 | 60分 | ○ | - |
| 生食 50ml | 点滴 | 15分 | ○ | ○ |

※ ゲムシタビン

★点滴時間30分を厳守★

間質性肺炎に注意(胸部放射線との併用は禁忌)

PLT5万-10万/ μ L又はANC500-1000/ μ Lの時→day8のGEMIは25%減量

PLT<5万/ μ L又はANC<500/ μ Lの時→day8のGEMIは中止