

胃癌 SOX+Trast 療法（導入）

◎化学療法のスケジュール

3週間(21日間)を1コースとして繰り返します。

(副作用の度合いにより、スケジュールの延期や治療内容に変更があります。)

薬剤名	手技	点滴時間	実施日
			1日目
トラスツズマブ (8mg/kg) 生食 250mL	点滴	初回90分以上かけて投与 2回目以降は30分間 まで短縮可	○
パロノセトロン 0.75mg デキサメタゾン 13.2mg	点滴	15分	○
オキサリプラチン (130mg/m ²) 5%ブドウ糖 500mL	点滴	120分	○
生食 50mL	点滴	15分	○

薬剤名	手技		内服期間	休薬期間
TS-1 1日2回 体表面積 ~1.24m ² :40mg/回 1.25~1.49m ² :50mg/回 1.50~ :60mg/回	内服	食後	1~14日間	15~21日間

久留米大学病院

SOX+Trast 療法(維持)

◎化学療法のスケジュール

3週間(21日間)を1コースとして繰り返します。

(副作用の度合いにより、スケジュールの延期や治療内容に変更があります。)

薬剤名	手技	点滴時間	実施日
			1日目
トラスツズマブ (6mg/kg) 生食 250mL	点滴	初回90分間 2回目以降は30分間 まで短縮可	○
パロノセトロン 0.75mg デキサメタゾン 13.2mg	点滴	15分	○
オキサリプラチン (130mg/m ²) 5%ブドウ糖 500mL	点滴	120分	○
生食 50mL	点滴	15分	○

薬剤名	用法		内服期間	休薬期間
TS-1 1日2回 体表面積 ~1.24m ² :40mg/回 1.25~1.49m ² :50mg/回 1.50~ :60mg/回	内服	食後	1~14日間	15~21日間

久留米大学病院