

scVRD(週1回:lite)

◎化学療法のスケジュール

5週間(35日間)を1コースとして繰り返します。

(副作用の度合いにより、スケジュールの延期や治療内容に変更があります。)

薬剤名	手技	点滴時間	実施日			
			1日目	8日目	15日目	22日目
※ボルテゾミブ (1.3mg/m ²) 生食 20mL	皮下注		○	○	○	○

※ボルテゾミブ(ベルケイド®)皮下注時:3mg1バイアルを生食1.2mLで溶解し
(2.5mg/mL)必要量を採取する

【レブラミドCap 15mg/BODY day1- 21連日内服】

【レナデックス錠40mg/BODY day1,8,15,22併用】

久留米大学病院

scVRD(週2回:strong)

◎化学療法のスケジュール

3週間(21日間)を1コースとして繰り返します。

(副作用の度合いにより、スケジュールの延期や治療内容に変更があります。)

薬剤名	手技	点滴時間	実施日			
			1日目	4日目	8日目	11日目
※ボルテゾミブ (1.3mg/m ²) 生食 20mL	皮下注	/	○	○	○	○

※ボルテゾミブ(ベルケイド®)皮下注時:3mg1バイアルを生食1.2mLで溶解し
(2.5mg/mL)必要量を採取する

【レブラミドCap 25mg/BODY day1-14連日内服】

【レナデックス錠40mg/BODY day1,4,8,11併用】

久留米大学病院